


Yaprak Leke Hastalığı (*Cercospora beticola*)



Amistar®Gold uygulanmış

İlaç uygulanmamış

**Amistar®Gold**

**ŞEKER PANCARINDA**  
Dıştan İçe Üstün Koruma

#### Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar

Bitki Adı	Hastalık	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Şeker pancarı	Yaprak Leke Hastalığı ( <i>Cercospora beticola</i> )	50 ml / da	28 gün



#### BÖLGE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

##### GENEL MÜDÜRLÜK

Syngenta Tarım San. ve Tic.A.Ş.  
Bayraklı Tower, Mansuroğlu Mah.  
Ankara Cad. No: 81 Kat: 17 35030 Bayraklı - İzmir  
Tel: 0232 413 00 55 Fax: 0232 435 18 85

##### Akdeniz Bölgesi

Fener Mah. Falez Cad. No: 20  
Lara - Muratpaşa - Antalya  
Tel: 0242 329 11 11 Fax: 0242 321 20 34

##### Ege Bölgesi

Mansuroğlu Mah. 283/1 Sok. No:38/2  
Bayraklı - İzmir  
Tel: 0232 348 87 87 Fax: 0232 348 87 88

##### GAP Bölgesi

İmam Bakır Mah. Ferah Kent Sitesi 688  
Sokak No: 13/32 Halilîye - Şanlıurfa  
Tel: 0414 316 57 38 Fax: 0414 316 57 39

##### Güney Bölgesi

Yeni Mah. İncirlik Bulv. No: 169 / A  
Sarçam - Adana  
Tel: 0322 332 81 00 Fax: 0322 332 81 03

##### İç Anadolu Bölgesi

Büyük kayalık Mah. Konya Org. San. Bölgesi  
15.sokak. No:16 Selçuklu - Konya  
Tel: 0332 236 98 79 Fax: 0332 236 98 69

##### Karadeniz Bölgesi

Cumhuriyet Mah. Kandilli Cad. No.3  
Perim Apt.D.1 Atakum - Samsun  
Tel: 0362 291 50 57 Fax: 0362 291 50 57

##### Marmara Bölgesi

Değirmenaltı Mah. Palamut Sokak Seren  
Yalı No:4 Süleymanpaşa/Tekirdağ  
Tel: 0282 262 04 08 Fax: 0282 260 14 45



**Amistar®Gold**

syngenta®

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA HATTI:114

Syngenta bir ZİMİD üyesidir.


! Kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz.  
Esas olan etiketteki bilgilerdir.  
Resmî tavsiyelere uyunuz.



[www.syngenta.com.tr](http://www.syngenta.com.tr)





Litrede 125 g Azoxystrobin ve 125 g Difenokonazole içeriği ile hem koruyucu hem de tedavi edici bir fungusittir. Bu çift yönlü etki mekanizması geniş spektrumlu hastalık kontrolü sağladığı gibi, hem kontak hem de güçlü bir sistemik etki yaratır.




İlaçlama sonrasında bitkinin tüm yeşil aksamlarından bünyesine alınarak; sistemik özelliği sayesinde eşit bir dağılım gösterir. Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes ve Oomycetes fungal etmen gruplarına karşı etkilidir. Antisporulant özelliği, hastalığın bitkide yayılmadan, hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

## Tüm Hastalık Evrelerinde Üstün Etki!



Amistar Teknolojisi

1 3 7 10  
Gün Gün Gün Gün





Rakip Aktif Madde


1 3 7 10  
Gün Gün Gün Gün

Yanda bulunan termal ölçümlerde görüldüğü gibi, **Amistar Gold** rakip ilaca göre bitki içinde çok daha hızlı hareket eder ve homojen bir şekilde tüm yaprağa yayılır. Uç kısımdan sap kısmına kadar yaprak yüzey alanının tamamında üstün bir şekilde koruma sağlar.

Bu şekilde bitki daha uzun süre korunur ve aynı zamanda daha uzun süre yeşil kalır.



2017 yılında Bursa ve Eskişehir'deki teknik demo çalışmalarında, Cercospora yaprak leke hastalığına karşı, **Amistar Gold** yaygın olarak kullanılan mevcut pazar standardı ürüne göre en az **%5 daha iyi** hastalık kontrolü sağlamıştır.



Cercospora hastalığının başlaması için, %90'ın üzerinde nispi nem, 25°C seviyelerinde gündüz sıcaklığı ve 15°C seviyelerinde gece sıcaklığı yeterlidir. Yaprak yüzeyinde ilk lekeler görüldüğünde ilaçlanmaya başlanmalıdır. Çevresel şartlar hastalık için uygun gittiği sürece, hasada 30 gün kalaya kadar 10-14 gün arayla ilaçlamaya devam etmek gerekebilir.

Özellik	Avantajı	Fayda
<b>Çift etki mekanizması</b>	Yüksek performans ve dayanıklılık yönetimi	Hastalığın tüm evrelerinde güvenilir kontrol
<b>Geniş spektrum</b>	Aynı anda birden fazla pancar yaprak hastalıklarına etkili	Tek ürün ile kolay çözüm
<b>Yıkanmaya dayanıklı</b>	Uzun süreli ve iklimsel koşullardan bağımsız devamlı koruma	Esnek kullanım ve kurtarıcı